

Bonte Bentheimer

Zaterdag 17 november 2012
Varkens KI Nederland
KI Station te Heino en
Kasteel 't Nijenhuis te Wijhe



Normale uterus van een zeug



 Lanbouwniversiteit Wageningen
Departement Dierwetenschappen



Open geknipte Cervix



Lanbouwniversiteit Wageningen
Departement Dierwetenschappen



Herkenning berigheid zeug

- Nieuwsgierigheid
- Mee dan normaal in beweging
- Opzwellen kling
- Stareflex



Beer en zeug



- Eerst snuffelen
- Dan onder vang stoten
- Dan pas bespringen



Beer en zeug



- Zeug geen interesse
- Staat bespringen niet meer toe



Nabootsen beer



- Berenlucht sprayen
- Rustig benaderen
- In vang trekken
- Gaan zitten



Insemineren



- Inbrengen pipet
- Weerstand
- Staart
- Opname



Bestelprocedure

- NAW gegevens en UBN nummer tijdig doorgeven.
- Leveringen op ma-woe-vr-za-dag.
- Opgave dag ervoor.
- Dit is veelal het moment dat zeug nieuwsgierig wordt.



Bewaren sperma

- Donker bewaren
- Meest ideale temperatuur is 17°C
- Niet in de zon





Hartelijk dank voor
uw aandacht!